



Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2023

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren								
		6	2	3	4	5–10	11 [*]	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60
			U4			U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus ^b			G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Diphtherie ^b			G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e	
Pertussis ^b			G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A3 ^e	
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b			G1		G2		G3 ^c												
Poliomyelitis ^b			G1		G2		G3 ^c							A1					
Hepatitis B ^b			G1		G2		G3 ^c												
Pneumokokken ^b			G1		G2		G3 ^c												S ^e
Meningokokken C								G1											
Masern							G1			G2								S ^f	
Mumps, Röteln							G1			G2									
Varizellen							G1			G2									
HPV – Humane Papillomviren													G1 ^d	G2 ^d					
Herpes zoster																		G1 ^h	G2 ^h
Influenza																			S (jährlich)
COVID-19																		G1 ⁱ , G2 ⁱ , A1 ⁱ	S ⁱ

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

f Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

g Impfung mit PCV20 (Änderung vom 28.09.2023)

h Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

i Impfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 3 Wochen (je nach Zulassung des Impfstoffs), und Impfabstand zwischen G2 und A1 ≥ 6 Monate

j Wiederholte Auffrischimpfung in einem Mindestabstand von 12 Monaten zur letzten Antigenexposition, vorzugsweise im Herbst

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden

Aktualisierung erfolgte am 25.05.2023 in Ausgabe 21/2023